

## ЕСТЕСТВЕННОЕ РАЗУБОЖИВАНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД МАЦЕСТЫ

*А. Н. Павлов*

Как известно, минеральные воды Мацесты на значительную глубину разбавлены пресными водами метеорного происхождения. Основная масса пресных вод поступает в недра месторождения с северо-востока, из зоны хребтов Ахштырь, Ахун и Бытха, по системе открытых трещин и карстовых ходов. Процессы разбавления на Мацесте захватили водовмещающую толщу известняков до глубины примерно 900 м. Динамика этого процесса изучена весьма детально, а гидрохимия до сих пор недостаточно ясна и понятна.

Еще в 1936—1939 гг. А. Н. Бунеев обратил внимание на то, что при сопоставлении найденных количеств сульфатов с общей концентрацией воды наблюдалось следующее: чем больше минеральная вода разбавлена, чем меньше в ней сероводорода, тем меньше в ней сульфатов, и наоборот. А. Н. Бунеев высказал предположение, что уменьшение содержания сульфатов в минеральных водах при их разбавлении может быть объяснено или тем, что подмешивающиеся пресные воды совершенно бессульфатны или же тем, что после смешения вод восстановительные процессы приводят к дальнейшему образованию  $H_2S$  за счет этих сульфатов [1]. В настоящее время появилась возможность это предположение А. Н. Бунеева рассмотреть на более обширном фактическом материале.

Разбавление минеральных вод Мацесты пресными водами протекает как в восстановительной, так и окислительной обстановке. При этом могут образоваться три гидрохимические зоны: 1) слабо восстановительная; 2) нейтральная; 3) слабо окислительная. Образование этих зон при смешении вод отмечено в Хосте в 1959 г.

В 1953—1956 гг. в поселке Хоста две пробуренные глубокие скважины дали сильно минерализованную сероводородную воду хлоридно-натриевого типа (типа Мацесты). Одну из скважин закрыли наглухо, а вблизи другой (Т-1) пробурили две поглощающие скважины П-1 и П-2. Эти скважины глубиной 50 м пройдены в аллювиальных отложениях р. Хосты, представленных галечником с песчаным и песчано-глинистым заполнителем и небольшими прослоями чистого песка и глин. Забой скважин расположен в толще глинистых сланцев. В скважину П-1 в 1959 г. начали сбрасывать минеральную сероводородную воду, при этом наблюдался следующий дебит поглощения,  $м^3/сутки$ :

|        |          |
|--------|----------|
| 19/III | 209.051  |
| 31/III | 518.400  |
| 8/IV   | 740.448  |
| 11/IV  | 1062.720 |
| 15/IV  | 1252.800 |
| 18/IV  | 1728.000 |
| 3/V    | 1434.240 |

Из скважины П-2 5/V 1959 г. начался самоизлив и появилось 0,015 г/л  $H_2S$ . Через 30 м по аллювиальному потоку во второй поглощающей скважине фиксировали воду смешанного типа. При этом, если в первую поглощающую скважину сбрасывали воду с минерализацией 22,91 г/л и содержанием сероводорода 452 мг/л, то во второй скважине минерализация воды падала до 18,76 г/л, а сероводород исчезал вовсе. Это свидетельствует о формировании нейтральной физико-химической зоны. Несколько позже во второй поглощающей скважине обнаружили сероводород (15 мг/л) — появление слабо восстановительной зоны. При этом очевидно наличие и слабо окислительной зоны.

В табл. 1 приведены некоторые расчеты происходящего смешения. При расчете предполагалось, что разбавление от минерализации 22,91 до 18,76 г/л происходило в воде, не содержащей солей и газов, т. е. минеральная вода смешивается с полностью дегазированной дистиллированной водой. При этом естественно, что количество всех химических компонентов в смеси снижается в 1,22 раза ( $R$  — степень разбавления), т. е. пропорционально уменьшению минерализации. Отношение фактической концентрации того или иного компонента к расчетной ( $K$  — коэффициент реального смешения) характеризует его поведение при реальном смешении.

Таблица 1

Смешение минеральной воды с пресной в пос. Хоста<sup>1</sup>

| Состав минеральной воды,<br>г/л | Скв. Т-1 с минеральной водой | Скв. П-2 с разбавленной минеральной водой | Расчетный состав смеси, $R = 1,22$<br>(на 27/IV 1959 г.) | Коэффициент реального смешения $K$ |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| $Na^+ + K^+$                    | 7,1401                       | 5,5398                                    | 5,850                                                    | 0,95                               |
| $Mg^{2+}$                       | 0,3477                       | 0,2839                                    | 0,285                                                    | 0,99                               |
| $Ca^{2+}$                       | 1,0680                       | 1,2280                                    | 0,880                                                    | 1,39                               |
| $HCO_3^-$                       | 0,7930                       | 0,3111                                    | 0,650                                                    | 0,48                               |
| $SO_4^{2-}$                     | 0,0049                       | 0,0247                                    | 0,004                                                    | 6,17                               |
| $Cl^-$                          | 13,4748                      | 11,3472                                   | 11,050                                                   | 1,03                               |
| $Br^-$                          | 0,0780                       | 0,0220                                    | 0,064                                                    | 0,34                               |
| $I^-$                           | 0,0079                       | 0,0020                                    | 0,006                                                    | 0,33                               |
| $H_2S_{общ}$                    | 0,4500                       | 0,0000                                    | 0,369                                                    | 0,00                               |
| Общая минерализация             | 22,9144                      | 18,7587                                   |                                                          |                                    |

Как показал подсчет, остаются неизменными относительные количества ионов натрия, магния, хлора, увеличивается количество ионов кальция и сульфат-ионов. При этом содержание кальция возрастает в 1,4 раза, а содержание сульфат-иона — в 6 раз. Значительно уменьшается  $HCO_3^-$ ,  $Br^-$ ,  $I^-$  и исчезает сероводород. Увеличение относительной концентрации иона  $Ca^{2+}$  можно объяснить привнесом его пресными водами, уменьшение  $HCO_3^-$  — процессом обизвесткования вмещающих пород при смешении сульфидно-карбонатного равновесия; уменьшение йода и брома — сорбцией на органических коллоидах, содержащихся в аллювиальных отложениях. Сероводород окисляется до коллоидной серы и ионов  $S_2O_3^{2-}$ ,  $SO_3^{2-}$ ,  $SO_4^{2-}$ .

Подобный расчет сделан нами и для Мацестинского района по глубоким скважинам Т-1 и Т-2 и для скважин Т-1 и Т-2 в Хосте (табл. 2). Обогащение вод ионами  $SO_4^{2-}$ ,  $S_2O_3^{2-}$  и коллоидной серой, как правило, происходит одновременно с обеднением их сероводородом. При этом обогащение коллоидной серой и  $S_2O_3^{2-}$  хорошо согласуется с уменьшением концен-

| Состав минеральной воды, г/л                                      | Магистраль                   |                         |                                                   |                      |                         |                                                  |                      |                         |                                                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                   | Скв. Т-1<br>1413—<br>—1507 м | Скв. Т-1 930—1200<br>м  | Расчетный состав<br>смеси 930—1200 м,<br>R = 1,09 | К                    | Скв. Т-1 702—800<br>м   | Расчетный состав<br>смеси 702—800 м,<br>R = 2,51 | К                    | Скв. Т-1 243—470<br>м   | Расчетный состав<br>смеси 243—470 м,<br>R = 4,13 | К                    |
| $\text{NH}_4^+$<br>$\text{Na}^+ + \text{K}^+$<br>$\text{Mg}^{2+}$ | 0.019<br>7.994<br>0.348      | 0.018<br>7.166<br>0.356 | 0.018<br>7.310<br>0.319                           | 1.02<br>0.98<br>1.12 | 0.008<br>3.205<br>0.134 | 0.008<br>3.170<br>0.138                          | 1.00<br>1.01<br>0.97 | 0.005<br>1.863<br>0.096 | 0.005<br>1.930<br>0.084                          | 1.00<br>0.97<br>1.14 |
| $\text{Ca}^{2+}$                                                  | 1.281                        | 1.084                   | 1.170                                             | 0.92                 | 0.510                   | 0.510                                            | 1.00                 | 0.357                   | 0.310                                            | 1.15                 |
| $\text{HCO}_3^-$                                                  | 0.590                        | 0.554                   | 0.541                                             | 1.02                 | 0.462                   | 0.235                                            | 1.96                 | 0.359                   | 0.143                                            | 2.50                 |
| $\text{HS}^-$                                                     | 0.104                        | 0.122                   | 0.096                                             | 1.28                 | 0.051                   | 0.041                                            | 1.25                 | 0.043                   | 0.025                                            | 1.72                 |
| $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$                                       | 0.0005                       | 0.0017                  | 0.00046                                           | 3.7                  | 0.0032                  | 0.0002                                           | 16.00                | 0.0004                  | 0.0001                                           | 4.00                 |
| $\text{SO}_3^{2-}$                                                | —                            | 0.0001                  | —                                                 | —                    | —                       | —                                                | —                    | 0.0001                  | —                                                | —                    |
| $\text{SO}_4^{2-}$                                                | 0.012                        | 0.013                   | 0.011                                             | 1.18                 | 0.017                   | 0.005                                            | 3.4                  | 0.001                   | 0.003                                            | 0.33                 |
| $\text{Cl}^-$                                                     | 15.154                       | 13.552                  | 13.850                                            | 0.98                 | 5.879                   | 6.030                                            | 0.97                 | 3.499                   | 3.68                                             | 0.95                 |
| $\text{Br}^-$                                                     | 0.060                        | 0.056                   | 0.055                                             | 1.02                 | 0.023                   | 0.024                                            | 0.96                 | 0.013                   | 0.014                                            | 0.93                 |
| $\text{J}^-$                                                      | 0.008                        | 0.008                   | 0.007                                             | 1.15                 | 0.0034                  | 0.0032                                           | 1.06                 | 0.0016                  | 0.0019                                           | 0.84                 |
| $\text{CO}_{2\text{св}}$                                          | 0.209                        | 0.160                   | 0.192                                             | 0.83                 | 0.109                   | 0.084                                            | 1.30                 | 0.063                   | 0.051                                            | 1.23                 |
| $\text{CO}_{2\text{раств}}$                                       | 0.132                        | 0.093                   | 0.120                                             | 0.74                 | —                       | 0.052                                            | —                    | —                       | 0.032                                            | —                    |
| $\text{H}_2\text{S}_{\text{св}}$                                  | 0.297                        | 0.244                   | 0.272                                             | 0.90                 | 0.092                   | 0.118                                            | 0.78                 | 0.058                   | 0.072                                            | 0.80                 |
| $\text{H}_2\text{S}_{\text{общ}}$                                 | 0.405                        | 0.355                   | 0.371                                             | 0.95                 | 0.144                   | 0.160                                            | 0.90                 | 0.102                   | 0.098                                            | 1.05                 |
| $\text{H}_2\text{S}_{\text{раств}}$                               | 0.107                        | 0.110                   | 0.098                                             | 1.12                 | 0.053                   | 0.042                                            | 1.26                 | 0.045                   | 0.026                                            | 1.73                 |
| $\text{S}_{\text{колл}}$                                          | 0.001                        | 0.0095                  | 0.001                                             | 9.5                  | —                       | 0.0004                                           | —                    | 0.0003                  | 0.00027                                          | 1.10                 |
| $\text{H}_2\text{SiO}_3$                                          | 0.110                        | 0.126                   | 0.101                                             | 1.24                 | 0.037                   | 0.0436                                           | 0.84                 | 0.021                   | 0.026                                            | 0.78                 |
| Общая минерализация                                               | 25.90                        | 23.07                   |                                                   |                      | 10.33                   |                                                  |                      | 6.260                   |                                                  |                      |

трации свободного сероводорода, а колебания концентраций  $\text{SO}_4^{2-}$  — с изменением общего  $\text{H}_2\text{S}$ .

В ряде случаев наблюдается увеличение количества общего сероводорода и одновременное уменьшение содержания иона  $\text{SO}_4^{2-}$ . Это, казалось бы, свидетельствует о наличии процессов сульфатредукции. Однако одновременное увеличение иона  $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$  и коллоидной серы указывает на процесс окисления сероводорода. Как следует из подсчета атомарной серы, процесс смешения сопровождается значительными потерями серы (до 25%). Очевидно, коллоидной серы выделяется гораздо больше и она отлагается во вмещающих породах.

Таким образом, гидрохимический анализ процесса смешения пресных метеорных вод с сероводородными водами Магистраль показывает, что предположение А. Н. Бунеева о сульфатредукции не подтверждается.

Хоста

| Скв. Т-2 1617—1684<br>м                                            | Скв. Т-2 932 м                                                      | Расчетный состав<br>смеси 932 м, R =<br>1,47                       | К                                                         | Скв. Т-2 448—457<br>м                                               | Расчетный состав<br>смеси 448—457 м,<br>R = 4,34                    | К                                                         | Скв. Т-1 2200 м                                                          | Скв. Т-1 1749—1827<br>м                                                  | Расчетный состав<br>смеси 1749—1827 м,<br>R = 1,05                       | К                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 0,025<br>8,707<br>0,350                                            | 0,016<br>5,925<br>0,266                                             | 0,017<br>5,920<br>0,237                                            | 0,88<br>1,00<br>1,12                                      | 0,006<br>2,046<br>0,086                                             | 0,006<br>2,060<br>0,083                                             | 1,00<br>0,97<br>1,05                                      | 0,018<br>7,085<br>0,341                                                  | 0,018<br>6,725<br>0,338                                                  | 0,017<br>6,720<br>0,323                                                  | 1,06<br>1,00<br>1,04                                         |
| 1,338                                                              | 0,918                                                               | 0,911                                                              | 1,00                                                      | 0,334                                                               | 0,315                                                               | 1,06                                                      | 1,145                                                                    | 1,104                                                                    | 1,040                                                                    | 1,06                                                         |
| 0,581<br>0,120<br>0,001<br>—<br>0,026<br>16,344<br>0,065<br>0,0123 | 0,431<br>0,122<br>0,0005<br>—<br>0,009<br>11,121<br>0,042<br>0,0087 | 0,395<br>0,082<br>0,0005<br>—<br>0,018<br>1,100<br>0,044<br>0,0084 | 1,09<br>1,50<br>1,00<br>—<br>0,50<br>1,00<br>0,96<br>1,04 | 0,376<br>0,047<br>0,0009<br>—<br>0,0067<br>3,679<br>0,015<br>0,0014 | 0,137<br>0,028<br>0,0002<br>—<br>0,0061<br>3,860<br>0,015<br>0,0029 | 2,75<br>1,68<br>4,50<br>—<br>1,10<br>0,95<br>1,00<br>0,48 | 0,586<br>0,111<br>0,0034<br>0,0002<br>0,008<br>13,485<br>0,052<br>0,0075 | 0,611<br>0,095<br>0,0005<br>0,0002<br>0,026<br>12,850<br>0,042<br>0,0071 | 0,560<br>1,060<br>0,0032<br>0,0002<br>0,008<br>12,800<br>0,049<br>0,0071 | 1,09<br>0,90<br>0,16<br>1,00<br>3,25<br>1,00<br>0,86<br>1,00 |
| 0,104<br>—<br>0,272<br>0,345<br>0,073<br>0,0014                    | 0,089<br>—<br>0,192<br>0,318<br>0,126<br>0,0013                     | 0,071<br>—<br>0,185<br>0,233<br>0,050<br>0,0010                    | 1,25<br>—<br>1,04<br>1,36<br>2,50<br>1,30                 | 0,074<br>—<br>0,068<br>0,116<br>0,048<br>0,0016                     | 0,025<br>—<br>0,064<br>0,081<br>0,017<br>0,0003                     | 2,96<br>—<br>1,06<br>1,44<br>2,82<br>5,30                 | 0,191<br>—<br>0,288<br>0,402<br>0,115<br>—                               | 0,210<br>—<br>0,267<br>0,364<br>0,096<br>0,0008                          | 0,182<br>—<br>0,274<br>0,382<br>0,108<br>—                               | 1,15<br>—<br>0,97<br>0,95<br>0,89<br>—                       |
| 0,053                                                              | 0,0440                                                              | 0,036                                                              | 1,22                                                      | 0,029                                                               | 0,013                                                               | 2,2                                                       | 0,034                                                                    | 0,06                                                                     | 0,033                                                                    | 1,09                                                         |
| 27,922                                                             | 18,902                                                              |                                                                    |                                                           | 6,599                                                               |                                                                     |                                                           | 23,0                                                                     | 21,9                                                                     |                                                                          |                                                              |

Гидрохимический анализ процесса смешения не только подтверждает факт разрушения минеральных вод пресными, но позволяет подойти к количественной оценке этого разрушения.

Подсчитав степень разбавления для разных объектов, можно выделить участки и периоды наибольших и наименьших поступлений пресных вод в толщи месторождения. Это позволит ставить вопрос о регуляции месторождения, а также позволит уточнить наиболее водообильные зоны за контуром месторождения для водоснабжения.

Гидрохимические процессы обуславливают существенные изменения во вмещающих породах. Представление об этих изменениях дают водные и углекислые вытяжки из пород, а также изучение их минералогического состава. Гидрохимические коэффициенты, полученные в результате химического анализа водных вытяжек, сведены в табл. 3.

Таблица 3

Результаты химического анализа водных вытяжек из пород Сочинского артезианского бассейна

| Район   | Глубина,<br>м | Порода                     | Процент встречаемости |                       |                            |                        | Число образцов |
|---------|---------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|----------------|
|         |               |                            | $r \frac{Na}{Cl} > 1$ | $r \frac{Ca}{Mg} > 1$ | $1 < r \frac{Ca}{Mg} < 10$ | $r \frac{Ca}{Mg} > 10$ |                |
| Мацесты | 0—20          | Мергели, глины, известняки | 88                    | 88                    | 75                         | 12                     | 8              |
| »       | 40—250        | Известняки, мергели        | 82                    | 60                    | 75,5                       | 21,5                   | 65             |
| »       | 430—900       | Известняки                 | 64,2                  | 36                    | 52                         | 48                     | 25             |
| »       | 900—1490      | »                          | 35,6                  | 43                    | 7,15                       | 92,85                  | 14             |
| Хосты   | 0—0           | Мергели                    | 25                    | 50                    | 100                        | 0,0                    | 4              |
| »       | 665—1932      | Известняки                 | 100                   | 86,3                  | 100                        | 0,0                    | 7              |

Согласно В. А. Сулину, отношение  $r \frac{Na}{Cl} > 1$  свидетельствует о континентальном типе преобразования состава вод [6]. На Мацесте у поверхности значения этого коэффициента превышают единицу в 88% случаев, а на глубине 900—1490 м — лишь в 35,6% случаев. Аналогичная зависимость сохраняется для значений  $r \frac{Ca}{Mg} > 1$  и  $1 < r \frac{Ca}{Mg} < 10$ . Только для  $r \frac{Ca}{Mg} > 10$  имеет место обратная зависимость.

По-видимому, при смешении сероводородных минеральных вод Мацесты с пресными метеорными водами породы-коллекторы зоны смешения обогащаются сульфатами натрия. При этом величина коэффициента  $r \frac{Ca}{Mg}$  определяется только ионом кальция, так как количество магния по всему разрезу заметно не меняется. Характерно, что количество иона хлора в породах-коллекторах по всему разрезу практически неизменно, даже в различных породах, известняках и мергелях. Количество иона натрия по разрезу также заметно не изменяется. Обогащены им только более глинистые породы — мергели.

В то же время концентрация иона  $SO_4^{2-}$  колеблется. Это можно объяснить только тем, что ион  $SO_4^{2-}$  — компонент химически неустойчивый: в одном случае он может образоваться за счет окисления сероводорода, а в другом — восстанавливаться. В первом случае породы будут обогащены ионом  $SO_4^{2-}$ , во втором — обеднены им.

Минеральные воды Мацесты, залегающие глубже зоны разбавления, наиболее обогащены  $H_2S$ , поскольку привнос кислорода извне отсутствует. В зоне разбавления, наоборот, происходит медленное, но постоянное разрушение сероводорода минеральной воды. Воды медленно обогащаются коллоидной серой, а также ионами  $S_2O_3^{2-}$ ,  $SO_3^{2-}$  и  $SO_4^{2-}$ , которые постепенно могут мигрировать в породу.

Если принять точку зрения А. Н. Бунеева о сульфатредукции в зоне смешения, то распределение сульфат-иона в породах-коллекторах должно быть либо одинаковым по всему разрезу, либо обратным, т. е. наиболее обеднены сульфатами должны быть породы от поверхности до глубины 900 м, что противоречит приводимым фактам, полученным в последние годы.

### Выводы

Гидрогеологический анализ процесса смешения сероводородных минеральных вод Хосто-Мацестинского месторождения с пресными метеорными водами подводит к выводам генетического характера.

Толщи известняков верхней юры и мела на определенном этапе геологического развития района были промыты пресными метеорными водами с образованием карстовых емкостей [5]. Одновременно произошло резкое обеднение толщ седиментационными солями. Далее карстовые емкости загрузились минеральной водой. Сами известняки обогатить эту воду солями не могли, так как наблюдаемый солевой комплекс в породах-коллекторах является эпигенетичным и определен химическим составом находящихся в них вод. Известняки вновь обогатились NaCl по всему разрезу в одних и тех же пределах, так как гидрохимический тип вод по всей толще оказался одинаков. Обогащение же пород сульфат-ионами произошло неравномерно, ввиду неравномерного распространения его в водах. В низах толщи, глубже 900 м, воды обеднены ионом  $\text{SO}_4^{2-}$ . В зоне опреснения воды и породы обогащаются ионом  $\text{SO}_4^{2-}$  за счет окисления сероводорода.

Как показал анализ водных вытяжек и вод, вмещающие толщи известняков не могут обогащать солями находящуюся в них воду. Следовательно, солевой состав минеральных вод формируется где-то на более глубоких горизонтах. Можно предполагать, что формирование солевого состава минеральных вод Мацесты происходит при смешении богатых сульфатами вод с водами бессульфатными и бескислородными. При этом богатые сульфатами воды должны иметь существенно хлоридный состав, так как иначе полученная смесь не может быть охарактеризована коэффициентом  $r \frac{\text{Na}}{\text{Cl}} < 1$ . Такой водой может быть морская вода, которая смешивается с бессульфатными водами юрских терригенных толщ, богатых, по-видимому, метаном и органическими продуктами.

Выдвинутое предположение может быть увязано с некоторыми существующими гипотезами о генезисе сероводородных вод Мацесты [3, 4, 7]. Современная связь минеральных вод с водами Черного моря предполагалась еще В. П. Шипокиным [7], а возможность поступления вод из юрских терригенных толщ допускалась Ф. А. Макаренко [4]. По-видимому, формирование минеральных вод Мацестинского месторождения шло и идет всеми тремя путями.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Бунеев А. Н. К проблеме происхождения минеральных вод Мацесты. Тр. ЛГГП АН СССР, т. II, 1949.
2. Огильви А. Н. О гидрогеологических условиях происхождения мацестинских минеральных вод и об их каптаже. Сб. «Курорт Мацеста», Сочи, 1928.
3. Овчинников А. М. Условия формирования мацестинских сероводородных вод. Тр. ЛГГП АН СССР, т. II, 1949.
4. Макаренко Ф. А. О генезисе сероводородных вод Мацесты. Тр. ЛГГП АН СССР, т. II, 1949.
5. Пастушенко Ю. Н. Погребенный карст верхнеюрских и меловых известняков Сочи-Сухумского района и его гидрогеологическое значение. Мат. IV конф. младших научных сотрудников и аспирантов ЛГГП АН СССР. Изд-во АН СССР, 1959.
6. Сулин В. А. Условия образования, основа классификации и состав природных вод. Ч. I. Изд-во АН СССР, 1948.
7. Шипокин В. П. Аналитические и графические методы исследования равновесных сложных систем. Центр. лаб. физ.-хим. анализа АН СССР, т. III, вып. 1, 1926.